调和线束中的平行平分模型

——2022年3道解析几何高考真题的统一背景研究

● 湖北省武昌实验中学 柯希湖

1 问题引路——高考真题呈现

考题1 (2022年北京卷第21题) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个顶点为 $A(0, 1)$, 焦距为 $2\sqrt{3}$.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 过点 $P(-2, 1)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C , 直线 AB, AC 分别与 x 轴交于点 M, N , 当 $|MN| = 2$ 时, 求 k 的值.

考题2 (2022年新高考I卷第21题) 已知点 $A(2, 1)$ 在双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2 - 1} = 1 (a > 1)$ 上, 直线 l 交 C 于 P, Q 两点, 直线 AP, AQ 的斜率之和为 0.

(1) 求 l 的斜率;

(2) 若 $\tan \angle PAQ = 2\sqrt{2}$, 求 $\triangle PAQ$ 的面积.

考题3 (2022年新高考II卷第21题) 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 $F(2, 0)$, 渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{3}x$.

(1) 求 E 的方程.

(2) 过 F 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点, 点 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 在 C 上, 且 $x_1 > x_2 > 0, y_1 > 0$. 过 P 且斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与过 Q 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交于点 M . 从下面①②③中选取两个作为条件, 证明另外一个成立:

① M 在 AB 上; ② $PQ \parallel AB$; ③ $|MA| = |MB|$.

注: 若选择不同的组合分别解答, 则按第一个解答计分.

2 背景介绍——平行平分模型

2.1 调和点列

欧式几何中的调和点列: 同一直线上依次排列的四个点 A, B, C, D , 若满足 $\frac{|AB|}{|CB|} = \frac{|AD|}{|CD|}$, 则称 A, B, C, D 构成调和点列.

射影几何中的调和点列: 欧式几何中的调和点列也是射影几何中的调和点列. 在此基础上, 将无穷远点看做一个点, 同一直线上依次排列的四个点 A, B, C, ∞ , 若满足 $\frac{|AB|}{|CB|} = \frac{|A\infty|}{|C\infty|} = 1$, 即 $|AB| = |CB|$, 则称 A, B, C, ∞ 构成调和点列.

2.2 调和线束

已知 P 是调和点列 A, B, C, D 所在直线外的任意一点, 则线束 PA, PB, PC, PD 构成调和线束.

注: 点 P 一般选为投射中心, 称为射心.

2.3 平行平分模型

如图1, 已知线束 l_1, l_2, l_3, l_4 交于点 P , 直线 l 分别交 l_1, l_2, l_3 于点 A, C, B .

图1

①若 l_1, l_2, l_3, l_4 为调和线束, $l \parallel l_4$, 则 $|AC| = |CB|$;

②若 $l \parallel l_4, |AC| = |CB|$, 则 l_1, l_2, l_3, l_4 为调和线束;

③若 l_1, l_2, l_3, l_4 为调和线束, $|AC| = |CB|$, 则 $l \parallel l_4$.

2.4 极点极线与调和点列

2.4.1 由调和点列得到极点极线

如图2, 定点 $P(x_0, y_0)$ 不在圆锥曲线 $\Gamma: Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ 上, 过点 P 的动直线 l 交 Γ 于 M, N 两点,

l 上不同于 P 的另一点 Q 满足 $\frac{|PM|}{|PN|} = \frac{|QM|}{|QN|}$, 则点 Q 的轨迹在直线 $Ax_0x +$

图2

$B \frac{x_0x + y_0y}{2} + Cy_0y + D \frac{x_0 + x}{2} + E \frac{y_0 + y}{2} + F = 0$ 上.

2.4.2 由极点极线得到调和点列

如图2, 定点 $P(x_0, y_0)$ 不在圆锥曲线 $\Gamma: Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ 上, 点 P 关于 Γ 的极线为 $Ax_0x + B \frac{x_0x + y_0y}{2} + Cy_0y + D \frac{x_0 + x}{2} + E \cdot$

$\frac{y_0+y}{2}+F=0$, 过点 P 的动直线 l 交该 Γ 于 M, N 两点, 交极线于 Q , 则 $\frac{|PM|}{|PN|} = \frac{|QM|}{|QN|}$, 即 P, Q, M, N 为调和点列.

注: 上述两个命题描述了圆锥曲线中极点极线与调和点列的基本关系, 结合调和点列与调和线束的基本关系, 三者可以相互转化. 两个命题的证明略.

3 命题背景——换位剖析真题

3.1 换位剖析 2022 年北京卷第 21 题

如图 3, 椭圆的左顶点 $D(-2, 0)$, 直线 $AD: y = \frac{1}{2}x + 1$, 恰好是点 P 关于椭圆的极线.

图 3

设直线 PC 交直线 AD 于点 J , 故 P, J, B, C 形成调和点列, 进而 AP, AJ, AB, AC 形成调和线束, 且 $AP \parallel MN$.

由平行平分模型①, 可知 $|DM| = |DN|$, 结合 $D(-2, 0)$, 故 $N(-1, 0)$.

将直线 $AN: y = x + 1$ 与椭圆方程 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 联立, 解得 $C(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5})$, 则 $k = k_{PC} = -4$.

注: (1) 发现直线 AD 是点 P 关于椭圆的极线很关键, 为后面寻找调和点列和调和线束打下基础.

(2) 找到调和点列 P, J, B, C , 再结合题设条件选取合适的射心 A , 得到调和线束 AP, AJ, AB, AC , 转化为平行平分模型解决问题.

3.2 换位剖析 2022 年新高考 I 卷第 21 题

如图 4, 设直线 AP, AQ 分别交 x 轴于点 B, D , 过点 A 作 x 轴垂线交 x 轴于点 N , 交直线 PQ 于点 S , 过点 A 作 y 轴垂线交直线 PQ 于点 T , 过点 S 作 y 轴的垂线与过点 T 垂直于 x 轴的直线交于点 K . 设 $T(x_0, 1), S(2, y_0)$, 则 $K(x_0, y_0)$.

图 4

由辅助线的作法可知, 四边形 $ATKS$ 是矩形, 所以直线 AK 斜率 k_{AK} 和直线 TS 的斜率 k_{TS} 互为相反数, 故 $k_{AK} = -k_{TS}$, 即 $k_{PQ} = -k_{AK}$.

由直线 AP, AQ 的斜率之和为 0, 得 $|BN| = |ND|$.

结合 $AT \parallel BD$, 由平行平分模型结论②, 得线束 AT, AS, AP, AQ 为调和线束, 进而 T, S, P, Q 为调和点列.

结合点 P, Q 在双曲线上, 得 T, S 关于双曲线调和共轭, 即点 T 在点 S 的极线上, 点 S 在点 T 的极线上.

点 $T(x_0, 1)$ 关于双曲线 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 的极线方程为

$\frac{x_0 x}{2} - y = 1$, 代入点 $S(2, y_0)$, 得 $y_0 = x_0 - 1$, 这意味着点 $K(x_0, y_0)$ 的轨迹为直线 $y = x - 1$.

经检验知, 点 $A(2, 1)$ 也在直线 $y = x - 1$ 上, 从而直线 AK 的方程为 $y = x - 1$, 于是 $k_{PQ} = -k_{AK} = -1$.

3.3 换位剖析 2022 年新高考 II 卷第 21 题

因为该试题是一道结构不良类型的证明题, 所以在此着重分析试题背景中的平行平分模型及应用过程, 部分步骤中涉及的代数运算证明仅做简单叙述 (主要涉及斜率条件的转化).

如图 5, 设直线 AB 与双曲线交于 C, D 两点, 由直线与双曲线及渐近线相交的性质得 $|AC| = |BD|$, 这意味着 AB 的中点即 CD 的中点, 这个中点即试题中准备研究的点 M .

图 5

设直线 CP, DQ 交于点 T , 取 PQ 中点 N , 直线 TN 交直线 AB 于点 L , 过点 T 作 PQ 的平行线 TS , 由 $|PN| = |NQ|$, 结合平行平分模型结论②, 线束 TS, TN, TP, TQ 为调和线束, 即线束 TS, TL, TC, TD 为调和线束.

(1) 选择①②证明③

若 $PQ \parallel AB$, 则 $TS \parallel AB$. 由平行平分模型结论①, 得 $|CL| = |DL|$, 即 L 是 CD 中点, 从而 $|AL| = |BL|$. 结合直线 MP, MQ 的斜率分别为 $-\sqrt{3}, \sqrt{3}$, 计算可得此时点 L 为点 M , 从而 $|MA| = |MB|$.

(2) 选择②③证明①

若 $PQ \parallel AB$, 结合 $TS \parallel PQ$, 则有 $TS \parallel AB$.

因为线束 TS, TL, TC, TD 为调和线束, 结合平行平分模型结论①, 可知 $|LA| = |LB|$.

由 $x_1 > x_2 > 0$ 得弦 PQ 不垂直于 x 轴, 所以弦 AB 也不垂直于 x 轴, 故弦 AB 的中垂线不过原点 O .

由直线 MP, MQ 的斜率分别为 $-\sqrt{3}, \sqrt{3}$, 计算可得 O, N, M 三点共线, 故点 M, L 都在直线 ON 上. 结合 $|MA| = |MB|, |LA| = |LB|$, 直线 ON 不是 AB 的中垂线, 从而点 M, L 重合. 故点 M 在 AB 上.

(3) 选择①③证明②, 略.

基于高等几何的极点极线的相关内容, 对尖子生而言, 一般用于速算结果、探究方向, 虽然解题很快, 但要慎重考虑是否可作为高中卷面的书写过程. $\blacksquare$